

HERRAMIENTAS UNIDIMENSIONALES PARA LA VALORACIÓN DEL DOLOR

INSTRUMENTO	COMPONENTES/INDICADORES	CONSIDERACIONES
Bried Pain Inventory Short Form (BPI-SF)	<p>Áreas de valoración: Severidad, Impacto en la vida diaria, Ubicación, Medicación, Cantidad de alivio</p> <p>Clasificación de 0-10</p> <p>Cuerpo neutral para medir LOCALIZACIÓN</p> <p>4 elementos para valorar la INTENSIDAD del dolor, donde 0: sin dolor y 10: dolor irresistible</p> <p>2 elementos que valoran el tratamiento y eficacia</p> <p>7 preguntas relacionadas a la INTERFERENCIA del dolor; interferencia con: act's generales, estado de ánimo, capacidad de caminar, trabajo, relaciones personales, el sueño, disfrute de la vida</p>	<p>Validada para personas con cáncer como aquellas sin cáncer, personas con enfermedades crónicas</p> <p>Auto administrada</p> <p>Dura 5 minutos en realizarse</p> <p>Formato entrevista</p>
Pediatric Pain Questionnaire (PPQ)	<p>Escala de caras</p> <p>Cuerpo neutral para describir LOCALIZACIÓN</p> <p>Elección de 4 lápices para valorar INTENSIDAD</p>	<p>Diseñada para niños/as de 5-16 años</p> <p>Utilizada en niños/as de 4-18 años</p> <p>Versión para niños/as, adolescentes y padres</p>

HERRAMIENTAS UNIDIMENSIONALES PARA LA VALORACIÓN DEL DOLOR

INSTRUMENTO	COMPONENTES/INDICADORES	CONSIDERACIONES
Faces Pain Scale Revised (FPS-R)	Escala de caras 6 caras neutrales Desde ningún dolor a tanto dolor Clasificación de 0-10	Diseñada para niños/as de 5-12 años Utilizada en niños/as de 4-18 años Rápida y fácil
Escala (NRS)	Clasificación de 0-10, en donde 0 equivale a "sin dolor" y 10 "dolor es insoportable"	Diseñada para niños/as mayores de 8 años, adolescentes, adultos y adultos mayores
Verbal Rating Score (VRS)	Lista de adjetivos que describen diferentes niveles de INTENSIDAD del dolor 5 puntos, incluye descripciones del dolor dolor: Leve, Moderado, Severo y Muy Severo	Utilizada en adultos Intensidad del dolor: Leve: 0-3; Moderado: 4-6; Grave: 7-10 Rápido y fácil de usar